



دانشگاه گنبد کاووس

نشریه "تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی"

دوره پنجم، شماره اول، بهار و تابستان ۹۷

<http://arpe.gonbad.ac.ir>

## کاربرد باکتری تثبیت کننده نیتروژن (*Azotobacter chroococcum*) و باکتری حل کننده فسفات (*Pseudomonas putida*) در گیاه سویا تحت رژیم های مختلف آبیاری

مجید قنبری<sup>۱</sup>، علی مختصی بیدگلی<sup>۲\*</sup>، پرریان طالبی سیه سران<sup>۳</sup>، حسن پیرانی<sup>۴</sup>، سهیل کرم نیا<sup>۵</sup>

<sup>۱</sup> دانشجوی دکترا، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

<sup>۲</sup> استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

<sup>۳</sup> دانش آموخته گان کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

<sup>۴</sup> دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۳

### چکیده

**مقدمه:** با توجه به نوسان شرایط محیطی، خشکی عمده ترین محدودیت در تولیدات محصولات زراعی بوده و حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از عملکرد محصولات زراعی را کاهش می دهد. تنش خشکی از تأثیرگذارترین نوع تنش در تولید دانه های روغنی در جهان به شمار می آید و می تواند تولید را در بسیاری از زمین های زراعی به شدت کاهش دهد. میکروارگانیسم های خاکزی در تثبیت نیتروژن هوا و انحلال فسفات های نامحلول خاک، همچنین سنتز هورمون های محرک رشد نظیر ایندول استیک اسید، جیبرلین ها، سیتوکینین ها و همچنین سنتز ویتامین ها و اسیدهای آمین مؤثر بوده و موجب افزایش عملکرد می گردند. در پژوهش حاضر تأثیر کاربرد باکتری تثبیت کننده نیتروژن / *ازتوباکتر کروکوکوم* و باکتری حل کننده فسفات *سودوموناس پوتیدا* بر کاهش اثرات کمبود آب آبیاری در رقم زراعی سویا تحت شرایط مزرعه مورد مطالعه قرار گرفته است.

**مواد و روش ها:** این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۹۵-۱۳۹۴ در دانشگاه تربیت مدرس به اجرا درآمد. در این آزمایش چهار تیمار آبیاری (شامل: ۱۵ (شاهد)، ۳۰ (تنش ملایم)، ۴۵ (تنش متوسط) و ۶۰ (تنش شدید) درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس از زمان گلدهی تا

\* نویسنده مسئول: [mokhtassi@modares.ac.ir](mailto:mokhtassi@modares.ac.ir)

پایان دوره رشد) و چهار نوع تلقیح بذر سویا با باکتری (شامل: شاهد یا بدون مصرف باکتری، تلقیح با /زئوباکتر کروکوکوم، تلقیح با سودوموناس پوتیدا/ و تلقیح با هر دو باکتری) در نظر گرفته شدند. طول ردیف‌ها در هر کرت آزمایشی ۶ متر با فاصله ۵۰ سانتی‌متر از هم در نظر گرفته شد. فاصله بین کرت‌ها و بین تکرارها به ترتیب یک و ۳/۵ متر در نظر گرفته شد. فاصله هر بوته از یکدیگر روی ردیف‌های کاشت ۸ سانتی‌متر در نظر گرفته شد. زمان بندی آبیاری براساس درصد تخلیه رطوبت خاک در ظرفیت زراعی در منطقه ریشه و عمق مدیریت آبیاری برای سویا حدود ۳۰ سانتی‌متر در نظر گرفته شد.

**نتایج:** نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته و تعداد شاخه‌های جانبی، کمترین ارتفاع نخستین غلاف از سطح زمین، بیشترین تعداد غلاف در بوته، عملکرد دانه، عملکرد ماده خشک و شاخص برداشت در تیمار کاربرد توأم /زئوباکتر کروکوکوم و سودوموناس پوتیدا/ در سطوح مختلف کم‌آبیاری مشاهده گردید. از نظر رژیم آبیاری، بیشترین ارتفاع بوته و تعداد شاخه‌های جانبی، کمترین ارتفاع نخستین غلاف از سطح زمین، بیشترین تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه، عملکرد ماده خشک در تیمار شاهد مشاهده شد.

**نتیجه‌گیری:** به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که کاربرد ازئوباکتر به تنهایی موجب افزایش ۲۵ درصد عملکرد دانه، کاربرد سودوموناس پوتیدا/ به تنهایی موجب افزایش ۳۰ درصد عملکرد دانه و کاربرد توأم هر دو باکتری موجب افزایش ۴۲ درصد عملکرد دانه شد که نشان‌دهنده توانایی کاربرد توأم /زئوباکتر کروکوکوم و سودوموناس پوتیدا/ در افزایش عملکرد و اجزای عملکرد در شرایط تنش بوده و در بروز مقاومت در گیاه سویا و جلوگیری از افت شدید عملکرد بسیار مؤثر است.

**واژه‌های کلیدی:** سویا، انحلال فسفر، تثبیت کننده نیتروژن، فسفر معدنی، کمبود آب

## مقدمه

دانه‌های روغنی بعد از غلات دومین منبع مهم تأمین انرژی مورد نیاز جوامع انسانی بوده و سویا یکی از مهم‌ترین گیاهان این طبقه بوده که با توجه با محدودیت‌های شدید منابع آبی در بیشتر مناطق کشور، تولید این گیاه می‌تواند به دو برابر میزان تولید سایر گیاهان روغنی از قبیل بادام‌زمینی، آفتابگردان و کلزا برسد (Ogini et al., 1999). تنش خشکی به‌عنوان مهم‌ترین تنش تأثیرگذار بر گیاهان زراعی کشور معرفی شده و با توجه به نوسان شرایط محیطی، عدم دسترسی به آب، عمده‌ترین محدودیت در تولیدات محصولات زراعی بوده و منجر به کاهش ۴۰ تا ۴۵ درصد از عملکرد محصولات زراعی می‌گردد (Belhassen, 1996). تنش‌هایی که سرعت رشد گیاه را در مراحل رشدی R1 و R5 در سویا کاهش می‌دهند، منجر به کاهش بیشتر عملکرد دانه می‌شوند (Fredrick et al., 2001). گزارش شده است که در شرایط کمبود رطوبت، شاخص سطح برگ و سرعت آسیمیلاسیون خالص سویا

کاهش پیدا کرده و وزن خشک اندام‌های هوایی را بیشتر از وزن خشک ریشه کاهش داد (Cox and Jolliff, 1987; Pannu et al., 1992).

کودهای بیولوژیک از جمله کودهای تثبیت‌کننده نیتروژن و حل‌کننده فسفات با استفاده از ظرفیت‌های طبیعی موجودات مفید خاک‌زی تهیه شده و تولید آن‌ها علاوه بر صرفه اقتصادی، به لحاظ رعایت جنبه‌های زیست‌محیطی نیز بسیار با ارزش است. کاربرد این مواد ضمن وارد کردن جمعیت انبوهی از میکروارگانیسم‌های فعال در حوزه فعالیت مستقیم ریشه‌ای، توان گیاه را برای مقابله با آفات و بیماری‌ها، مقاومت به تنش‌های محیطی و جذب بیشتر عناصر غذایی افزایش می‌دهد (Malakooti, 2005).

ازتوباکتر دارای گونه‌های بسیاری بوده که کروکوکوم (*chroococcum*) یکی از گونه‌های مهم آن است و معمولاً در خاک‌های زراعی یافت می‌شود. این باکتری از لحاظ فیزیولوژیک، هوازی بوده و در دمای ۲۵ درجه سلیسیوس ماندگاری دارد. آن‌ها قادرند نیتروژن اتمسفری را پس از مصرف کربوهیدرات (مانند: دکستروز، مالتوز، لاکتات و ...) تولید کرده که محصول فرعی آن دی‌اکسید کربن است (Emtiazi, 2007). گزارش شده است که تلقیح بذور با ازتوباکتر کروکوکوم توانایی دفاعی گیاه چغندر قند به تنش اکسیداتیو را در برگ‌های آن بهبود بخشیده و این بهبود به دلیل تولید آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت مثل سوپراکسید دسموتاز، پراکسیداز، کاتالاز و محتوای کلروفیل و کارتنوئیدها است (Stajner et al., 1997). نتایج مطالعات نشان داده است که تلقیح بذور کلزا با باکتری ازتوباکتر به‌طور معنی‌داری طول گیاه، قطر ساقه، تعداد شاخه‌ها، وزن هزار دانه، میزان محصول و روغن را در مقایسه با گروه شاهد در کلزا افزایش داد (Asghar et al., 2002). پژوهشگران دریافتند که گیاه گندم و پنبه تلقیح‌شده با تثبیت‌کننده‌های آزاد نیتروژن، دارای رشد و عملکرد بالایی بوده و این امر عملکرد محصولاتی مانند غلات، چغندر قند، صیفی جات و کلم را تا ۱۰ درصد افزایش داد (Zahir et al., 1999; Kumar et al., 2001; Rubenchik, 1963; Rodelas et al., 1996). در پژوهشی در زمینه تأثیر ازتوباکتر روی دانه یا نشاءهای گندم، برنج، پیاز، کلم علوفه‌ای و خردل سفید در هندوستان گزارش شد که در همه موارد افزایش عملکرد مثبت بوده است، لیکن در مورد کلم، برنج و بادنجان این تأثیر معنی‌دار بود (Kennedy et al., 2004). در آزمایشی دیگر نیز گزارش شد تلقیح گیاه سویا با ریزوباکتری‌هایی مثل *برادی‌ریزوبیوم ژاپونیکوم* (*Bradyrhizobium japonicum*) باعث افزایش میانگین پروتئین دانه تا ۲۸ درصد نسبت به شاهد شد (Egamberdiyeva et al., 2004).

فسفر (P) معمولاً می‌تواند به دلیل فرم غیرقابل حل بودن آن محدودکننده رشد باشد. گیاهان می‌توانند فسفر را فقط در فرم‌های یونی قابل انحلال به صورت  $\text{H}_2\text{PO}_4^-$  و  $\text{HPO}_4^{2-}$  جذب کنند. بسیاری از باکتری‌های توانایی محلول‌سازی فسفر غیرقابل دسترس را با ترشح اسیدهای ارگانیک و

فسفات‌ها به صورت قابل حل دارند (Kim et al., 1998). پژوهشگران دریافتند که در میان پنج ایزوله جنس سودوموناس که رشد انگور را تحریک کردند، سه مورد از آن‌ها ACC دی‌آمیناز تولید کرده و حلال فسفر هم بودند و دو نمونه دیگر به غیر از اعمال فوق، تولید آکسین نیز انجام می‌دادند (Belimov et al., 2001). تحقیقات انجام شده در چین نشان داد استفاده از باکتری‌های محرک رشد میزان محصول را بیش از ۱۱/۵ درصد افزایش داد (Mei, 1989). هم‌چنین تلقیح بذور با آزوسپیریوم با تولید ACC دی‌آمیناز، تولید اتیلن که نقش بازدارندگی در گیاه میزبان داشته کاهش یافت و طول ریشه، رشد گیاهی، طول کلئوپتیل، وزن خشک و تازه گیاهچه‌های گندم تلقیح شده به رغم وجود تنش خشکی، افزایش یافت (Grinchko and Glick, 2001; Alvarez et al., 1996).

با توجه به اینکه بیشتر اراضی کشور تحت تأثیر تنش خشکی هستند و سویا گیاهی حساس به تنش خشکی است، هم‌چنین به دلیل استفاده از کود زیستی به عنوان نوعی راهکار مقاومت به تنش خشکی و تأثیر آن بر رشد و نمو سویا از طریق افزایش میزان جذب فسفر در گیاه، در همین راستا برای بررسی تأثیر ازتوباکتر در ترکیب با باکتری حل‌کننده فسفات بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا، پژوهش حاضر در شرایط مزرعه‌ای انجام شد.

## مواد و روش‌ها

به منظور بررسی اثرات رژیم‌های مختلف آبیاری و باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن و حل‌کننده فسفات بر رشد و عملکرد گیاه سویا (*Glycine max* Merrill) رقم تار، پژوهشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۹۵-۱۳۹۴ در دانشگاه تربیت مدرس به اجرا درآمد. در این آزمایش چهار تیمار آبیاری { ۱۵ (شاهد)، ۳۰ (تنش ملایم)، ۴۵ (تنش متوسط) و ۶۰ (تنش شدید) درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس از زمان گلدهی تا پایان دوره رشد } و چهار نوع تلقیح بذر سویا با باکتری (شامل شاهد یا بدون مصرف باکتری، تلقیح با /ازتوباکتر کروکوکوم (*Azotobacter chroococcum*)، تلقیح با سودوموناس پوتیدا (*Pseudomonas putida*) و تلقیح با هر دو باکتری) در نظر گرفته شده‌اند. میکروارگانیزم‌های تثبیت‌کننده نیتروژن و فسفر در این آزمایش از مؤسسه تحقیقات خاک و آب تهیه گردیدند. بذر رقم تار سویا بلافاصله قبل از کاشت با باکتری‌های مورد نظر بر حسب نوع تیمار تلقیح گردید (Somasegaran and Hoben, 1994).

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه مورد مطالعه در جدول ۱ آمده است. مقادیر عناصر غذایی مورد نیاز براساس نتایج آزمون خاک مشخص و عناصر نیتروژن و پتاسیم به صورت قبل از کاشت به خاک افزوده شده و با خاک مخلوط شدند. طول هر کرت آزمایشی ۶ متر و عرض آن ۳ متر مشخص گردید که فاصله هر خط کاشت ۵۰ سانتی‌متر در نظر گرفته شد. فاصله بین کرت‌ها و بین تکرارها

به ترتیب یک و ۳/۵ متر در نظر گرفته شد. فاصله بوته‌ها از یکدیگر روی ردیف‌های کاشت ۸ سانتی‌متر در نظر گرفته شد.

جدول ۱- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه قبل از اجرای آزمایش (عمق ۰-۳۰ سانتی‌متر)

Table 1- Physical and chemical properties of soil of farm before testing (0-30 cm)

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Sandy-Loam          | بافت خاک (Soil texture)                  |
| 19.87 (% by volume) | ظرفیت زراعی (Field capacity)             |
| 8.11 (% by volume)  | نقطه پژمردگی (Wilting point)             |
| 50.5 (mg/kg)        | گوگرد (Sulfur)                           |
| 345 (mg/kg)         | پتاسیم (Potassium)                       |
| 10 (mg/kg)          | فسفر (Phosphorus)                        |
| 0.2 (%)             | نیتروژن کل (Total nitrogen)              |
| 1.8 (%)             | مواد آلی (Organic material)              |
| 7.7                 | اسیدیته (pH)                             |
| 1.10 (dS/m)         | هدایت الکتریکی (Electrical conductivity) |

زمان‌بندی آبیاری براساس درصد تخلیه رطوبت خاک در ظرفیت زراعی در منطقه ریشه و عمق مدیریت آبیاری برای سوپا حدود ۳۰ سانتی‌متر بود که با استفاده از روابط ۱ و ۲ محاسبه گردید. مقدار آب خاک ابتدا به روش وزنی و سپس با استفاده از TDR<sup>۲</sup> (مدل IMKO- GmbH, D-76275, Germany) (Trime-FM) در عمق ذکر شده تعیین گردید. برای تعیین رابطه بین مقدار عددی ارائه شده توسط TDR و درصد حجمی رطوبت خاک اندازه‌گیری شده به روش وزنی از منحنی کالیبراسیون استفاده شد. برای استفاده از TDR، در مرکز هر واحد آزمایشی یک لوله دسترسی<sup>۳</sup> از جنس PVC تعبیه شد. هم‌چنین، برای تعیین مقدار آب آبیاری از لوله‌های مجهز به کنتور استفاده گردید. با استفاده از داده‌های به‌دست آمده از رابطه ۱ درصد تخلیه آب قابل دسترس خاک در منطقه مؤثر ریشه و از رابطه ۲ مقدار آب مورد نیاز برای آبیاری محاسبه شد:

$$\text{رابطه ۱} \quad (FC - \theta) / (FC - PWP) = \text{حداکثر تخلیه مجاز (MAD)}^4$$

در این فرمول FC، PWP و  $\theta$ : به ترتیب رطوبت خاک در ظرفیت زراعی<sup>۵</sup>، نقطه پژمردگی دائم<sup>۶</sup> و درصد حجمی رطوبت خاک قبل از آبیاری می‌باشد.

<sup>۲</sup> Time Domain Reflectometry (TDR)

<sup>۳</sup> Access tube

<sup>۴</sup> Maximum Allowable Depletion (MAD)

$$V_d = MAD \times ASW \times R_z \times 10 \quad \text{رابطه ۲}$$

در این فرمول  $V_d$ : حجم آب آبیاری (میلی‌متر)،  $ASW$ : آب قابل دسترس خاک برابر با ۱۱۷/۶ میلی‌متر در هر متر عمق خاک و  $R_z$ : عمق مؤثر ریشه برابر با ۰/۳ متر می‌باشند. آب قابل دسترس خاک عبارت از مقدار آب موجود در ناحیه ریشه بین ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائم است. مقدار آب استفاده شده برای آبیاری همه تیمارها در مرحله رشد رویشی و زایشی پس از استقرار گیاه یکسان بود (Chung et al., 2002).

در پایان رسیدگی فیزیولوژیکی عملیات برداشت صورت گرفت و در رطوبت ۱۴ درصد عملکرد و اجزای عملکرد اندازه‌گیری شد. در زمان برداشت تعداد ۱۰ بوته به‌طور تصادفی از هر کرت انتخاب و به آزمایشگاه منتقل شدند و صفات از جمله ارتفاع بوته، ارتفاع نخستین غلاف، تعداد شاخه جانبی، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه، عملکرد ماده خشک و شاخص برداشت اندازه‌گیری شدند. پس از یادداشت‌برداری، داده‌های به‌دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SAS نسخه ۹/۲ (Soltani, 2015) تجزیه شد. مقایسه میانگین‌ها توسط آزمون LSD انجام گردید. برای رسم نمودارها از نرم‌افزار Excel استفاده شد.

## نتایج و بحث

**ارتفاع بوته:** تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که ارتفاع بوته از نظر رژیم آبیاری و کود بیولوژیک در سطح احتمال آماری یک درصد معنی‌دار است (جدول ۲). مقایسه میانگین رژیم آبیاری نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته در تیمار شاهد (۴۴/۷۲ سانتی‌متر) بود که ۳۷/۹۰ درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت و کمترین آن در تیمار تنش شدید (۲۷/۷۷ سانتی‌متر) مشاهده شد (جدول ۳). همچنین در مقایسه میانگین کود بیولوژیک، بیشترین مقدار ارتفاع بوته در تیمار تلقیح توأم/زئوباکتر کروکوکوم و سودوموناس پوتیدا/ (۴۸/۲۳ سانتی‌متر) بود که ۵۱/۹۵ درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت و کمترین مقدار آن در تیمار شاهد (۲۳/۱۷ سانتی‌متر) مشاهده گردید (جدول ۳).

پژوهش‌ها نشان داد که ارتفاع بوته سویا در شرایط کم آبیاری در مرحله گلدهی ( $R_2$ ) و در مرحله غلاف‌دهی ( $R_4$ ) نسبت به آبیاری کامل در طی فصل رشد گیاه، کاهش یافت (Foroud et al., 1993). نتایج تحقیقات پژوهش‌گران بیان‌گر این مطلب بود که کاهش آب قابل دسترس در طول فصل رشد، باعث کاهش ارتفاع گیاه، تعداد و طول میانگره و تعداد شاخه‌های جانبی سویا می‌شود (Ceccon et al., 2002).

<sup>5</sup> Field capacity (FC)

<sup>6</sup> Permanent wilting point (PWP)

al., 1994). ارتفاع بوته شاخصی از رشد رویشی محسوب می‌شود که با توجه به افزایش قابل ملاحظه این ویژگی بر اثر افزایش فراهمی میزان نیتروژن، فسفر و آب مشخص می‌گردد که رشد رویشی به شدت متأثر از کاربرد این کود بیولوژیک است (Kapulnic et al., 1985). پژوهشگران در بررسی اثرات تلقیح بذر سویا با باکتری *رایزوبیوم* و *پزودوموناس* مشاهده نمودند که ارتفاع گیاه در زمان برداشت و تعداد و وزن گره در بوته در تیمارهای تلقیح به‌طور معنی‌داری نسبت به تیمارهای عدم تلقیح افزایش یافت و مصرف توأم هر دو گونه باکتری *رایزوبیوم* و *پزودوموناس* در مقایسه با مصرف انفرادی هریک از دو گونه باکتری تأثیر بیشتری بر ارتفاع بوته سویا داشته است (Argaw, 2012).

**ارتفاع نخستین غلاف از سطح زمین:** مطابق جدول ۲، ارتفاع نخستین غلاف از سطح زمین از نظر رژیم آبیاری و کود بیولوژیک در سطح احتمال آماری یک درصد معنی‌دار بود (جدول ۲). مقایسه میانگین رژیم آبیاری نشان داد که بیشترین ارتفاع نخستین غلاف مربوط به تیمار تنش شدید (۹/۵۵ سانتی‌متر) بود که ۴۳/۹۷ درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داشت و کمترین آن در تیمار شاهد (۵/۳۵ سانتی‌متر) مشاهده شد (جدول ۳). هم‌چنین در مقایسه میانگین کود بیولوژیک، بیشترین مقدار ارتفاع نخستین غلاف از سطح زمین در تیمار شاهد (۸/۴۳ سانتی‌متر) و کمترین مقدار آن در تیمار تلقیح توأم *ازتوباکتر* و *سودوموناس پوتیدا* (۶/۵۲ سانتی‌متر) مشاهده گردید که ۲۹/۲۹ درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت (جدول ۳).

به‌طور کلی هر چقدر ارتفاع اولین غلاف پایین‌تر باشد پتانسیل عملکرد بالاتری را از بوته‌ها می‌توان انتظار داشت؛ زیرا غلاف‌ها در طول بیشتری از ساقه تشکیل می‌شوند. نتایج تحقیقات نشان داد که با افزایش مصرف کود بیولوژیک ارتفاع غلاف‌بندی سویا افزایش یافت که این امر باعث افزایش تعداد غلاف در بوته و در نهایت عملکرد دانه می‌شود (Yasari, 2013). پژوهش‌گران اظهار داشتند که ارتفاع تشکیل نخستین غلاف در بوته از طریق تعداد گل‌های تولید شده و مقدار ریزش گل‌ها در هر گره تنظیم می‌شود. از طرفی فراهمی آب، فسفر و نیتروژن به‌وسیله افزایش تولید گل و یا کاهش ریزش گل و غلاف‌های جوان بر ارتفاع تشکیل نخستین غلاف در بوته تأثیر می‌گذارد (Board et al., 1999). محققان در بررسی کود آلی و زیستی در تولید لوبیا بیان کردند که افزایش فعالیت ریزموجودات زنده خاک در شرایط آبیاری می‌تواند روی ارتفاع تشکیل نخستین غلاف در بوته اثر معنی‌داری داشته باشد (Tavassoli et al., 2009). نتایج بررسی اثر تنش خشکی روی مؤلفه‌های رشد نشان داد که تنش خشکی از طریق کندی رشد در گره‌ها، کاهش توسعه و دوام سطح برگ و کاهش منابع ذخیره و تولید مواد فتوسنتزی، باعث افزایش ارتفاع تشکیل نخستین غلاف در بوته شد (Shareif and Keshta, 2006).

جدول ۲- تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر ازتوباکتر کروکوکوم و سودوموناس پوتیدا بر برخی از صفات سویا تحت رژیم‌های مختلف آبیاری  
Table 2- Analysis of variance (mean square) of effect of *Azotobacter* and *Pseudomonas putida* on some traits in soybean under different irrigation regimes

| منبع تغییرات<br>S.O.V.               | DF | ارتفاع بوته<br>Plant height | ارتفاع نخستین غلاف<br>First pod height | تعداد شاخه جانبی<br>Number of lateral branch | تعداد غلاف در بوته<br>Number of pod/plant | تعداد دانه در غلاف<br>Number of seed/pod |
|--------------------------------------|----|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| بلوک<br>Block                        | 2  | 1.56 <sup>ns</sup>          | 1.36 <sup>ns</sup>                     | 0.03 <sup>ns</sup>                           | 330.46 <sup>ns</sup>                      | 0.15 <sup>ns</sup>                       |
| رژیم آبیاری<br>Irrigation regime (I) | 3  | 644.29 <sup>**</sup>        | 43.11 <sup>**</sup>                    | 1.19 <sup>**</sup>                           | 3697.22 <sup>**</sup>                     | 0.25 <sup>*</sup>                        |
| کود بیولوژیک<br>Bio-Fertilizer (B)   | 3  | 1403.29 <sup>**</sup>       | 8.25 <sup>**</sup>                     | 0.50 <sup>*</sup>                            | 538.02 <sup>*</sup>                       | 0.19 <sup>ns</sup>                       |
| آبیاری × کود<br>I × B                | 9  | 6.34 <sup>ns</sup>          | 0.19 <sup>ns</sup>                     | 0.02 <sup>ns</sup>                           | 13.56 <sup>ns</sup>                       | 0.01 <sup>ns</sup>                       |
| خطا<br>Error                         | 30 | 8.45                        | 1.02                                   | 0.15                                         | 142.54                                    | 0.07                                     |
| ضریب تغییرات<br>CV (%)               | -  | 8.10                        | 13.62                                  | 10.15                                        | 14.32                                     | 12.31                                    |

ns, \* and \*\*، non-significant difference, significant difference at the level of five and one percent probability, respectively.  
ns و \*\*، به ترتیب عدم وجود اختلاف معنی دار و اختلاف معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصد.



جدول ۳- مقایسه میانگین اثرات رژیم آبیاری و کود بیولوژیکی بر صفات مورد ارزیابی گیاه سویا

| Treatments                                     | Plant height (cm)  | First pod height (cm) | Number of lateral branch | Number of pod/plant |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Irrigation Regime</b>                       |                    |                       |                          |                     |
| ۱۵ درصد تخلیه از ظرفیت زراعی                   | 44.72 <sup>a</sup> | 5.35 <sup>d</sup>     | 4.28 <sup>a</sup>        | 108.88 <sup>a</sup> |
| <b>Control</b>                                 |                    |                       |                          |                     |
| ۳۰ درصد تخلیه از ظرفیت زراعی                   | 38.41 <sup>b</sup> | 6.40 <sup>c</sup>     | 4.07 <sup>ab</sup>       | 78.82 <sup>b</sup>  |
| <b>Mild stress</b>                             |                    |                       |                          |                     |
| ۴۵ درصد تخلیه از ظرفیت زراعی                   | 32.62 <sup>c</sup> | 8.36 <sup>b</sup>     | 3.81 <sup>bc</sup>       | 76.82 <sup>b</sup>  |
| <b>Moderate stress</b>                         |                    |                       |                          |                     |
| ۶۰ درصد تخلیه از ظرفیت زراعی                   | 27.77 <sup>d</sup> | 9.55 <sup>a</sup>     | 3.55 <sup>c</sup>        | 68.88 <sup>b</sup>  |
| <b>Sever stress</b>                            |                    |                       |                          |                     |
| <b>کود بیولوژیک</b>                            |                    |                       |                          |                     |
| <b>Bio-Fertilizer</b>                          |                    |                       |                          |                     |
| Control                                        | 23.17 <sup>d</sup> | 8.43 <sup>a</sup>     | 3.64 <sup>b</sup>        | 75.02 <sup>b</sup>  |
| <i>Azotobacter</i>                             | 31.78 <sup>c</sup> | 7.68 <sup>ab</sup>    | 3.94 <sup>ab</sup>       | 81.43 <sup>ab</sup> |
| <i>Pseudomonas putida</i>                      | 40.34 <sup>b</sup> | 7.02 <sup>bc</sup>    | 4.03 <sup>a</sup>        | 86.36 <sup>a</sup>  |
| <i>Azotobacter</i> + <i>Pseudomonas putida</i> | 48.23 <sup>a</sup> | 6.52 <sup>c</sup>     | 4.11 <sup>a</sup>        | 90.59 <sup>a</sup>  |

میانگین‌هایی که در هر ستون دارای حرف مشترک می‌باشند، بر اساس آزمون LSD در سطح احتمال پنج درصد اختلاف معنی‌داری با یکدیگر ندارند.  
Means in each column followed by similar letters are not significantly different at the % 5 probability level (LSD Test).

**تعداد شاخه جانبی:** با توجه به نتایج تجزیه واریانس، تعداد شاخه جانبی از نظر رژیم آبیاری در سطح احتمال آماری یک درصد و از نظر کود بیولوژیک در سطح احتمال پنج درصد معنی‌دار بود (جدول ۲). بیشترین تعداد شاخه جانبی از نظر رژیم آبیاری در تیمار شاهد (۴/۲۸) و کمترین مقدار آن در تیمار تنش شدید (۳/۵۵) دیده شد (جدول ۳). از نظر کود بیولوژیک، بیشترین تعداد شاخه جانبی در تیمار کاربرد توأم سودوموناس پوتیدا/ و/زتوباکتر (۴/۱۱) مشاهده شد و کمترین مقدار آن در تیمار شاهد (۳/۶۴) وجود داشت (جدول ۳).

در آزمایش بررسی دو رقم سویا در معرض تنش آبی (عدم انجام آبیاری تا زمان تخلیه ۳۵، ۵۵ و ۷۵ درصد آب قابل دسترس) مشخص شد که تنش آبی باعث کاهش ارتفاع گیاه، تعداد برگ‌ها و شاخه‌ها، سطح کل برگ، وزن خشک شاخه و عملکرد بذر شد (El-Kheir et al., 1994). تنش خشکی جذب و حلالیت عناصر غذایی را در خاک نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و گزارش شده که تنش رطوبتی باعث کاهش عناصر پر مصرف در خاک می‌گردد (Viets, 1972). هم‌چنین مشخص شده است که تحت شرایط تنش آبی، جذب نیتروژن در گیاهان سویا و برنج کاهش می‌یابد (Tanguilic et al., 1987). با این حال، افزایش قابلیت دسترسی گیاه به نیتروژن، فسفر و سایر عناصر غذایی تحت تأثیر سیستم‌های تغذیه آلی نیز توسط گیاه باعث افزایش رشد و در نتیجه افزایش فتوسنتز شده و از عوامل افزایش عملکرد، تعداد ساقه جانبی و سایر صفات مورفولوژیک می‌باشد (Malakooti and Sepehr, 2004).

نتایج مطالعات نشان دادند که تلقیح بذور کلزا با باکتری/زتوباکتر میکوریزا به‌طور معنی‌داری طول گیاه، قطر ساقه و تعداد شاخه‌های جانبی را در مقایسه با گروه شاهد افزایش داد (Asghar et al., 2002). هم‌چنین در پژوهش دیگری مشخص شد که تلقیح ریشه‌های کلزا، گندم، گوجه‌فرنگی و آفتابگردان با سودوموناس پوتیدا، رشد و توسعه گیاهی را به‌صورت معنی‌داری افزایش داد و منجر به افزایش تعداد شاخه‌های جانبی گردید (Okon and Kapulnik, 1986). استفاده از کودهای بیولوژیک، از جمله/زتوباکتر و سودوموناس پوتیدا به‌علت افزایش عناصر غذایی قابل دسترس، اصلاح خواص فیزیکی خاک، جذب عناصر غذایی تولید شاخ و برگ را افزایش می‌دهد. زیرا با افزایش میزان نیتروژن و فسفر قابل دسترس گیاه تحت تأثیر این تیمارها، رشد و نمو و فتوسنتز گیاه افزایش یافته و تعداد شاخه‌های جانبی و سایه‌انداز گیاه افزایش می‌یابد (Christodoulakis and Margaritis, 1996).

**تعداد غلاف در بوته:** نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تعداد غلاف در بوته از نظر رژیم آبیاری در سطح احتمال آماری یک درصد و از نظر کود بیولوژیک در سطح احتمال خطای پنج درصد معنی‌دار بود (جدول ۲). بیشترین تعداد غلاف در بوته از نظر رژیم آبیاری در تیمار شاهد (۱۰۸/۸۸) مشاهده گردید و کمترین مقدار آن در تیمار تنش شدید (۶۸/۸۸) دیده شد که ۵۸/۰۷ درصد نسبت

به شاهد کاهش یافت (جدول ۳). همچنین، از نظر کود بیولوژیک، بیشترین تعداد غلاف در بوته در تیمار کاربرد توأم سودوموناس پوتیدا و /زتویاکتر (۹۰/۵۹) مشاهده شد و کمترین مقدار آن در تیمار شاهد (۷۵/۰۲) وجود داشت (جدول ۳).

ریزش غلاف از واکنش‌های مشخص سویا به تنش رطوبتی در طی دوره زایشی است (Shaw and Laing, 1966). کدهم و همکاران (Kadhem et al., 1985) گزارش نمودند با تأخیر در یک‌بار آبیاری گیاهان سویا از مرحله رشدی  $R_1$  تا  $R_4$ ، تعداد غلاف در بوته به‌طور خطی کاهش می‌یابد. همچنین هر گونه کاهش در فراهمی نیتروژن و فسفر در طی دوره رشد گیاه، موجب کاهش شاخص سطح برگ و دوام برگ‌ها شده، فعالیت فتوسنتزی کانوپی را کاهش داده که نتیجه این شرایط، کاهش در تولید غلاف است (Pedersen and Lauer, 2004). صدیق و جولیف (Seddigh and Jollif, 1998) بیان کردند که گیاهان سورگوم تلقیح شده با آزوسپریلوم کمتر تحت تأثیر تنش رطوبتی قرار گرفتند. این گیاهان آب بیشتری را در اندام هوایی خود نگه داشتند همچنین دارای پتانسیل آب برگ بالاتر و دمای کانوپی پایین‌تری در مقایسه با گیاهان بدون تلقیح بودند. به‌علاوه استاجنر و همکاران (Stajner et al., 1997) گزارش کردند که گیاهان تیمار شده با /زتویاکتر کروکوکوم دارای فعالیت بیشتر آنزیم‌های آنتی اکسیدانی بوده و بنابراین کمتر از شرایط تنش رطوبتی خسارت می‌بینند.

**تعداد دانه در غلاف:** نتایج جدول ۲ نشان داد که تعداد دانه در غلاف از نظر رژیم آبیاری در سطح احتمال آماری پنج درصد معنی‌دار است. بیشترین تعداد دانه در غلاف از نظر رژیم آبیاری در تیمار شاهد (۲/۳۹) مشاهده گردید و کمترین مقدار آن در تیمار تنش شدید (۲/۰۶) بود که ۱۶/۰۱ درصد کاهش نسبت به شاهد دیده شد (جدول ۵).

محققین گزارش نمودند که کم آبیاری و یا تنش رطوبتی در دوره زایشی سویا، تعداد دانه در غلاف را کاهش می‌دهد (Neyshabouri and Hatfield, 1986). به نظر می‌رسد که کاهش رطوبت قابل دسترس در مرحله دانه‌بندی، تعداد دانه در غلاف به‌دلیل افزایش سقط تخمک در درون غلاف کاهش یافته است. این نتایج با یافته‌های سایر محققین مطابقت دارد (Shaw and Korte et al., 1983; laing, 1966). محققان در آزمایش‌های خود در آفتابگردان دریافتند که تعداد دانه پر در طبق در شرایط تنش گلدهی نسبت به دانه‌بندی کاهش بیشتری داشت که این مسئله به خاطر کاهش اسیمیلات‌های تولیدی در شرایط تنش در مرحله گلدهی به خاطر تولید سطح برگ کمتر در این شرایط است. همچنین تیمارهای کودی به‌دلیل تأمین بهتر و کامل‌تر عناصر غذایی تعداد دانه پر بیشتری را تولید کرده است، زیرا در شرایط کاربرد توأم سودوموناس پوتیدا و /زتویاکتر گیاه چه از نظر تأمین نیتروژن و چه از نظر فسفر در شرایط متعادلی قرار دارد و گیاه هنگام تغذیه با این کودهای زیستی رشد بهتری را نشان می‌دهد (Demir et al., 2006).

**وزن صد دانه:** وزن صد دانه از نظر رژیم آبیاری، کود بیولوژیک و برهمکنش رژیم آبیاری × کود بیولوژیک غیرمعنی‌دار بود (جدول ۴). هر چند که تأثیر کود بیولوژیک بر وزن صد دانه معنی‌دار نبوده است، لیکن استفاده از باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن و حل‌کننده فسفات موجب استفاده بهتر از شرایط محیطی، جذب بیشتر نیتروژن، فسفر و سایر عناصر غذایی از خاک توسط گیاه، افزایش فعالیت‌های متابولیکی و ماده‌سازی از دلایل افزایش وزن صد دانه در این دو سیستم تغذیه‌ای می‌باشد. بعضی از پژوهشگران افزایش کارایی مصرف نور با جذب عناصر غذایی بیشتر از خاک را عامل افزایش برخی از اجزای عملکرد از قبیل وزن هزار دانه و وزن طبق ذکر کرده‌اند (Hall et al., 1995).

پژوهشگران دریافته‌اند که تیمار تنش شدید باعث کاهش در تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف شد، با این حال شرایط برای انتقال مجدد بیشتر فراهم گردیده و گیاه با افزایش وزن دانه هر چند به‌صورت غیرمعنی‌دار، تعداد دانه و غلاف کمتر را تا حدودی جبران نموده است. این مکانیسم جبرانی در اجزاء عملکرد سویا در نتایج دیگر تحقیقات نیز مشاهده شده است (Rostamzadeh-Kaleibar et al., 2011). تنش کمبود آب در مرحله رشد رویشی نسبت به کمبود آن در مرحله زایشی خسارت کمتری روی وزن صد دانه و عملکرد دانه دارد. با وجود این، وزن صد دانه و عملکرد دانه فرآیندهائی هستند که نسبت به کمبود آب حساس‌تر هستند (Hsiano, 1973) و در شرایط کمبود رطوبت این فرآیندها کاهش می‌یابند. تنش کمبود آب از طریق کاهش تقسیم سلولی و رشد باعث کاهش وزن صد دانه شده، لیکن این صفت به‌طور مستقیم به عوامل زراعی، اقلیمی و ژنتیکی بستگی داشته و عدم معنی‌داری آن توجیه می‌گردد (Nesmith and Ritchie 1992).

**عملکرد دانه:** عملکرد دانه از نظر رژیم آبیاری و کود بیولوژیک در سطح احتمال آماری یک درصد معنی‌دار است (جدول ۴). جدول ۵ نشان داد که بیشترین مقدار عملکرد دانه از نظر رژیم آبیاری مربوط به تیمار شاهد (۲۱۶/۵۹ گرم بر مترمربع) بود و کمترین مقدار آن به تیمار تنش شدید (۱۴۷/۷۸ گرم بر مترمربع) تعلق داشت که ۳۱/۷۷ درصد نسبت به شاهد کاهش یافت. بیشترین مقدار عملکرد دانه از نظر کود بیولوژیک به تیمار کاربرد توأم سودوموناس پوتیدا و آزتوباکتر (۲۳۱/۷۷ گرم بر مترمربع) تعلق داشت و کمترین مقدار آن در تیمار شاهد (۱۳۳/۸۴ گرم بر مترمربع) مشاهده گردید (جدول ۵).

جدول ۴- تجزیه واریانس (میانگین مربعیات) اثر/تزیواکتر کروکوکوم و سودوموناس پوتیدا بر برخی از صفات سویا تحت رژیم‌های مختلف آبیاری  
Table 4- Analysis of variance (MS) of effect of *Azotobacter* and *Pseudomonas putida* on some of traits in soybean under different irrigation regimes

| منبع تغییرات<br>S.O.V.               | درجه آزادی<br>DF | وزن صد دانه<br>Weight of 100 seed | عملکرد دانه<br>Seed yield | عملکرد ماده خشک<br>Dry matter yield | شاخص برداشت<br>Harvest index |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| بلوک<br>Block                        | 2                | 5.14 <sup>ns</sup>                | 1711.29 <sup>ns</sup>     | 2413.28 <sup>ns</sup>               | 200.49 <sup>ns</sup>         |
| رژیم آبیاری<br>Irrigation regime (I) | 3                | 3.04 <sup>ns</sup>                | 10624.6 <sup>**</sup>     | 6454.66 <sup>**</sup>               | 20.66 <sup>ns</sup>          |
| کود بیولوژیک<br>Bio-Fertilizer (B)   | 3                | 5.71 <sup>ns</sup>                | 21812.0 <sup>**</sup>     | 3526.02 <sup>*</sup>                | 810.81 <sup>**</sup>         |
| آبیاری × کود<br>I × B                | 9                | 0.26 <sup>ns</sup>                | 88.15 <sup>ns</sup>       | 129.54 <sup>ns</sup>                | 28.79 <sup>ns</sup>          |
| خطا<br>Error                         | 30               | 4.65                              | 631.35                    | 998.27                              | 142.28                       |
| ضریب تغییرات<br>CV (%)               | -                | 10.93                             | 13.64                     | 21.31                               | 19.01                        |

ns, \* and \*\*: non-significant difference, significant difference at the level of five and one percent probability, respectively.  
ns و \* و \*\*: به ترتیب عدم وجود اختلاف معنی دار و اختلاف معنی دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد.

جدول ۵- مقایسه میانگین اثرات رژیم آبیاری و کود بیولوژیکی بر صفات مورد ارزیابی گیاه سویا

| Table 5- Mean comparison of effects of irrigation regime and bio-fertilizer on measured traits of soybean plant |                    |                                |                      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| تیمارها                                                                                                         | تعداد دانه در غلاف | Seed yield (g/m <sup>2</sup> ) | عملکرد ماده خشک      | شاخص برداشت        |
| Irrigation Regime                                                                                               |                    |                                |                      |                    |
| ۱۵ درصد تخلیه از ظرفیت زراعی                                                                                    | 2.39 <sup>a</sup>  | 216.59 <sup>a</sup>            | 174.98 <sup>a</sup>  | -                  |
| ۳۰ درصد تخلیه از ظرفیت زراعی                                                                                    | 2.34 <sup>a</sup>  | 197.73 <sup>a</sup>            | 156.91 <sup>ab</sup> | -                  |
| ۴۵ درصد تخلیه از ظرفیت زراعی                                                                                    | 2.22 <sup>ab</sup> | 174.33 <sup>b</sup>            | 140.55 <sup>bc</sup> | -                  |
| ۶۰ درصد تخلیه از ظرفیت زراعی                                                                                    | 2.06 <sup>b</sup>  | 147.78 <sup>c</sup>            | 120.59 <sup>c</sup>  | -                  |
| Bio-Fertilizer                                                                                                  |                    |                                |                      |                    |
| Control                                                                                                         | -                  | 133.84 <sup>d</sup>            | 125.47 <sup>b</sup>  | 55.00 <sup>b</sup> |
| <i>Azotobacter</i>                                                                                              | -                  | 167.37 <sup>c</sup>            | 149.87 <sup>ab</sup> | 56.32 <sup>b</sup> |
| <i>Pseudomonas putida</i>                                                                                       | -                  | 203.45 <sup>b</sup>            | 150.62 <sup>ab</sup> | 68.89 <sup>a</sup> |
| <i>Azotobacter+Pseudomonas putida</i>                                                                           | -                  | 231.77 <sup>a</sup>            | 167.07 <sup>a</sup>  | 70.73 <sup>a</sup> |

میانگین‌هایی که در هر ستون دارای حرف مشترک می‌باشند، بر اساس آزمون LSD در سطح احتمال پنج درصد اختلاف معنی‌داری با یکدیگر ندارند.

Means in each column followed by similar letters are not significantly different at the % 5 probability level (LSD Test).

کاهش عملکرد سویا در اثر کم آبیاری در تحقیقات متعددی گزارش شده است (Foroud *et al.*, 1986; Cox and Jolliff, 1986; Neyshabouri and Hatfield, 1986). نتیجه گیری شده کاهش در تعداد غلاف در واحد سطح در اثر شرایط کم آبیاری مهم ترین دلیل برای کاهش عملکرد دانه سویا است (Varela, 1998; Senthong *et al.*, 1986). پژوهشگران گزارش کردند که تیمارهای آبیاری ناقص (۳۰ تا ۵۰ درصد آب کمتر در مقایسه با آبیاری کامل) به طور متوسط ۵۰ درصد عملکرد کمتری در مقایسه با آبیاری کامل دارا هستند (Jolliff and Cox, 1986). محققان گزارش نمودند تنش حاصل از ۶۰ تا ۱۰۰ درصد تخلیه رطوبتی در مرحله زایشی، تعداد غلاف در ساقه اصلی و در نهایت عملکرد دانه را کاهش می دهد. بنابر نظر این محققین، کاهش در تولید کربوهیدرات ها برای نمو دانه در اثر کم آبیاری و همچنین توسعه ضعیف سیستم آوند در نزدیکی بالای گل آذین، از جمله مهم ترین دلایل فیزیولوژیک برای کاهش عملکرد دانه در شرایط تنش رطوبتی است (Noureldin *et al.*, 1987).

در مورد تأثیر تیمارهای اعمال باکتری بر عملکرد دانه باید اظهار شود علاوه بر اینکه استفاده از باکتری در شرایط عدم تنش رطوبتی از طریق افزایش جذب عناصر غذایی موجب افزایش عملکرد دانه می گردد (Biswas *et al.*, 2000; Dobbelaere *et al.*, 1999) در شرایط تنش نیز گزارش شده استفاده از باکتری های *آزوسپریلوم* و *ازتوباکتر* از طریق افزایش تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف (Razi and Sen, 1996; Stajner *et al.*, 1997) مقاومت گیاه به شرایط کم آبیاری افزایش می یابد و عملکرد دانه کمتر در شرایط تنش رطوبتی کاهش می یابد.

**عملکرد ماده خشک:** نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عملکرد ماده خشک از نظر رژیم آبیاری در سطح احتمال آماری یک درصد و از نظر کود بیولوژیک در سطح احتمال آماری پنج درصد معنی دار است (جدول ۴). مقایسه میانگین داده ها از نظر رژیم آبیاری نشان داد که بیشترین عملکرد ماده خشک در تیمار شاهد (۱۷۴/۹۸ گرم بر مترمربع) مشاهده شد و کمترین میزان آن در تیمار تنش شدید (۱۲۰/۵۹ گرم بر متر مربع) دیده شد که ۴۵/۱۰ درصد نسبت به شاهد کاهش یافت (جدول ۵). از نظر کود بیولوژیک بیشترین عملکرد ماده خشک در تیمار کاربرد توأم *سودوموناس پوتیدا* و *ازتوباکتر* (۱۶۷/۰۷ گرم بر مترمربع) و کمترین مقدار آن در تیمار شاهد (۱۲۵/۴۷ گرم بر مترمربع) مشاهده گردید (جدول ۵).

کاهش ماده خشک گیاه سویا در پاسخ به کمبود فراهمی آب در سایر تحقیقات نیز گزارش شده است (Wang *et al.*, 1995; Inamullah, 2005). شواهد زیادی وجود دارد که کاهش فراهمی آب سبب کاهش جذب عناصر غذائی (Blum, 1996)، افت شاخص سطح برگ و توان فتوسنتزی گیاه می شود (Ribas-Carbo *et al.*, 2005) که نتیجه آن کاهش عملکرد ماده خشک گیاهی می باشد.

پژوهشگران اظهار داشتند کاهش عملکرد ماده خشک سویا در شرایط کمبود آب، احتمالاً مرتبط با آبسزیک اسید تولید شده در سلول‌های گیاهی می‌باشد که فعالیت این هورمون سبب کاهش تقسیم سلولی و سنتز DNA می‌شود (Lobato et al., 2008). آن‌ها اظهار داشتند اسید آبسزیک تولید شده در اثر شرایط کم آبی، سبب القای بیان ژنی می‌شود که از فعالیت پروتئین وابسته به سیکلین (Cyclin- dependent activity (ICK1)) جلوگیری می‌کند. این پروتئین (ICK1) در فرآیندهای تقسیم سلولی مؤثر است و بنابراین جلوگیری از فعالیت آن، مانع از رشد و توسعه گیاه و در نهایت باعث کاهش عملکرد ماده خشک گیاه می‌گردد (Jakoby et al., 2006).

گزارش‌های متعددی وجود دارد که ریزوباکتری‌های تحریک کننده رشد<sup>۷</sup> رشد گیاه را از طریق افزایش جذب عناصر معدنی مانند نیتروژن، فسفر، پتاس و ریز مغذی‌ها افزایش می‌دهد (Dobbelaere et al., 1999). هرچند در مورد مکانیسم افزایش جذب عناصر غذایی در حضور PGPR ها اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از محققین بر این عقیده‌اند که افزایش جذب عناصر غذایی در حضور این میکروارگانیسم‌ها ناشی از گسترش سیستم ریشه‌ای می‌باشد و گیاه از طریق ریشه گسترده‌تر، عناصر غذایی بیشتری را جذب می‌کند (Biswas et al., 2000) در مقابل، سایر محققین اظهار داشتند که PGPR ها از جمله گونه‌های *سودوموناس پوتیدا* و *زوتوباکتر* از طریق افزایش شکل محلول قابل جذب عناصر غذایی در محیط ریشه و تثبیت عناصر موجود در هوا، باعث افزایش سرعت و مقدار جذب عناصر غذایی توسط گیاه شده و در نتیجه عملکرد ماده خشک گیاهی افزایش می‌یابد (Kapulnik et al., 1985).

**شاخص برداشت:** تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که صفت شاخص برداشت از نظر کود بیولوژیک در سطح احتمال آماری یک درصد معنی‌دار است (جدول ۴). مقایسه میانگین شاخص برداشت از نظر کود بیولوژیک بیانگر این مطلب بود که بیشترین میزان شاخص برداشت در تیمار کاربرد توأم *سودوموناس پوتیدا* و *زوتوباکتر* (۷۰/۷۳) وجود داشته که ۲۲/۲۴ درصد نسبت به شاهد افزایش داشته و کمترین مقدار آن در تیمار شاهد (۵۵/۰۰) مشاهده گردید (جدول ۵).

اگر چه صفت شاخص برداشت از نظر رژیم‌های آبیاری معنی‌دار نشده است لیکن، شاخص برداشت دارای یک میزان حداکثر است که در برخی گیاهان زراعی اصلاح شده به حداکثر خود نزدیک شده است. بنابراین شاخص برداشت صفی ژنتیکی و تقریباً ثابت است (Hay and Porter, 2006). هرچند برخی پژوهش‌ها کاهش شاخص برداشت را در اثر کمبود آب در مرحله زایشی سویا گزارش کرده‌اند (Taylor et al., 1991). علت غیرمعنی‌داری شاخص برداشت در سطوح تنش خشکی را می‌توان به افزایش بارندگی از یک سو و از سوی دیگر، کاهش دما و در نتیجه کاهش تبخیر و تعرق و بهبود

<sup>۷</sup> PGPR



شرایط رشد گیاه مرتبط دانست و هم‌چنین فراهمی بیشتر نیتروژن و فسفر در اثر مصرف باکتری موجب افزایش فعالیت فتوسنتزی گیاه شده و توانسته شاخص برداشت را افزایش دهد (Daneshian et al., 1999). دانشیان و همکاران (Daneshian et al., 1999) نیز افزایش شاخص برداشت سویا را در واکنش به کاربرد باکتری‌های آزادی تثبیت‌کننده نیتروژن از جمله */زئوباکتر* گزارش کرده است. پژوهشگران دلیل این افزایش شاخص برداشت در سیستم تغذیه باکتریایی در شرایط تنش خشکی را ناشی از مطابقت بیشتر به عناصر غذایی قابل دسترس با نیازهای گیاه در سیستم تلفیقی می‌دانند (Malakooti et al., 2004). از دلایل افزایش شاخص برداشت در این سیستم را می‌توان به حفظ و نگهداری عناصر غذایی خاک و جلوگیری از آبشویی نیتروژن و فسفر موجود در آن، افزایش فعالیت‌های بیولوژیک و بهبود ساختمان خاک توسط این باکتری‌ها اشاره کرد (Fages and Arsac, 1991).

### نتیجه‌گیری

. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته و تعداد شاخه‌های جانبی، کمترین ارتفاع نخستین غلاف از سطح زمین، بیشترین تعداد غلاف در بوته، عملکرد دانه، عملکرد ماده خشک و شاخص برداشت در تیمار کاربرد توأم */زئوباکتر* و *سودوموناس پوتیدا* در سطوح مختلف کم‌آبیاری مشاهده گردید. بهترین تیمار کودی کاربرد توأم *سودوموناس پوتیدا* و */زئوباکتر* بوده که در تنش ملایم و تنش متوسط بهترین نتایج را به همراه دارد. با توجه به نتایج توصیه می‌گردد که استفاده توأم از باکتری‌های دی‌ازتروف و باکتری‌های حل‌کننده فسفات با توجه توانایی‌های خاص این باکتری‌ها در جهت افزایش قابلیت دسترسی مواد غذایی برای گیاه و افزایش تولید فیتوهورمون‌های گیاهی در مواقع تنش کم آبی، موجب مقابله گیاه میزبان با شدت‌های متغیر تنش کم‌آبی شده و از افت شدید عملکرد جلوگیری می‌نمایند

### منابع

- Alvarez M.I., Sueldo R.J., Barassi C.A. 1996. Effect of *Azospirillum* on coleoptiles growth in wheat seedlings under water stress. *Cereal Research Community*, 24: 101-107.
- Argaw A. 2012. Evaluation of co-inoculation of *Bradyrhizobium japonicum* and Phosphate solubilizing *Pseudomonas* spp. effect on soybean (*Glycine max* L. Merr.) in Assossa Area. *Journal of Agricultural Science and Technology*, 14 (1): 213-224.
- Asghar H.N., Zahir Z.A., Arshad M., Khaliq A. 2002. Relationship between invitro production of auxins by rhizobacteria and their growth-promoting activities in (*Brassica Juncea* L.). *Biology and Fertility of Soil*, 35: 231-237.

- Belhassen E.1996. Drought in higher plants: Genetical, physiological and molecular biology analysis. Ensa-Inra Agap, Montpellier, France, 152 p.
- Belimov A.A., Safronova V.I., Sergeyeva T.A., Egorova T.N., Matveyeva V.A., Tsyganov V.E., Borisov A.Y., Tikhonovich I.A., Kluge C., Preisfeld A. 2001. Characterization of plant growth-promoting rhizobacteria isolated from polluted soils and containing 1-aminocyclopropane 1-carboxylate deaminase. Canadian Journal of Microbiology, 47: 642-652.
- Biswas P.K. 2008. Agricultural Microbiology. Dominant Publishers and Distributors. Orient Offset, Delhi-110053, Pp: 188-317.
- Blum A.1996. Crop response to drought and the interpretation of adaptation. Plant Growth Regulation, 20: 135-148.
- Board J.E., Kang M.S., Harville B. G.1999. Path analyses of yield formation process for late-planted soybean, Agronomy Journal, 91: 128-135.
- Ceccon p., Dall-Costa L., Giovanardi R., Rogger C.1994. The interaction of sowing date and water availability in determining plant architecture, fruiting pattern and yield components of soybean. Journal of Agronomy and Crop Science, 173: 172-183.
- Christodoulakis N.S., Margaris N.S. 1996. Growth of corn (*Zea mays*) and sunflower (*Helianthus annuus*) plant is affected by water and sludge treatment plant. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 57: 300-306.
- Chung Y.C., Son D.H., Ahn D.H. 2002. Application of natural zeolite for high-strength ammonium-bearing wastewater treatment. Pp. 63-64. In: Misaelides, p. (ed.) 6th International conference on the occurrence, properties and utilization of natural zeolites. Greece.
- Cox W.J., Jolliff G.D.1986. Growth and yield of sunflower and soybean under soil water deficits. Agronomy Journal, 78: 226-230.
- Daneshian J., Majidi A., Hashemi Dezfouli A., Noor Mohammadi G. 1999. The effect of drought on quantitative and qualitative characteristics of two soybean cultivars. Iranian Journal of Crop Sciences, 1 (3): 35-46. (In Persian).
- Demir A.O., Goksoy A.T., Buyukcangaz H., Turan Z.M., Koksall E.S. 2006. Deficit irrigation of sunflower (*Helianthus annuus* L.) in a sub-humid climate. Irrigation Science, 24 (4): 279-289.
- Dobbelaere S., Croonenborghs A., Thys A., Vande Broek A., Vanderleyden J. 1999. Phytostimulatory effect of *Azospirillum brasilense* wild type and mutant strains altered in IAA production on wheat. Plant Soil, 212: 155-164.
- Egamberdiyeva D., Qarshieva D., Davranov K. 2004. Growth and yield of soybean varieties inoculated with *Bradyrhizobium* spp in N-deficient calcareous soils. Biology and Fertility of Soils, 40: 144-146.

- El-Kheir M.S.A., Kandil S.A., Mekki B.B. 1994. Physiological response of two sunflower cultivars grown under water stress conditions as affected by CCC treatments. *Egyptian Journal of Physiology Science*, 18 (1): 179-200.
- Emtiazi G. 2007. Soil microbiology. Mani Press, Pp: 79-107. (In Persian).
- Fages J., Arsac J.F. 1991. Sunflower inoculation with *Azospirillum* and other plant growth promoting rhizobacteria. *Plant and Soil*, 137: 87-90.
- Foroud N., Mundel H.H., Saindon G., Entz T. 1993. Effect of level and timing of moisture stress on soybean plant development and yield components. *Irrigation Science*, 13: 149-155.
- Fredrick J.R., Camp C., Bauer R. 2001. Crop Ecology, Production & Management: Drought-stress effects on branch and main stem seed yield and yield components of determinate soybean. *Crop Science*, 41: 759-763.
- Grichko V.P., Glick B.R. 2001. Amelioration of flooding stress by ACC deaminase-containing plant growth-promoting bacteria. *Plant Physiology and Biochemistry*, 39:11-17.
- Hall A.J., Connor D. J., Sadras V.D. 1995. Radiation use efficiency of sunflower crops: Effects of specific leaf nitrogen and ontogeny. *Field Crops Research*, 41: 56-77.
- Hay R., Porter J. 2006. The physiology of crop yield. Blackwell Publishing, 314 p.
- Hsiano T.C. 1973. Plant responses to water stress. *Annual Review Plant Physiology*, 24: 519-570.
- Inamullah P., Isoda A. 2005. Adaptive responses of soybean and cotton to water stress. *Plant Production. Science*, 8: 16-26.
- Jakoby M.J., Weinel C., Pusch S., Kuijt S.J.H., Merkle T., Dissmeyer N., Schnittger A. 2006. Analysis of the subcellular localization, function and proteolytic control of the Arabidopsis cyclin-dependent kinase inhibitor ick1/krp1. *Plant Physiology*, 141(4): 1293-1305.
- Kadhem F., Specht A., Williams J.E. 1985. Soybean irrigation serially timed during stages R1 to R6. yield component responses. *Agronomy Journal*, 77: 299-304.
- Kapulnik Y., Gafny R., Okon Y. 1985. Effect of *Azospirillum* spp. inoculation on root development and  $\text{NO}_3^-$  uptake in wheat in hydroponic system. *Canadian Journal of Botany*, 63: 627-631.
- Kennedy I.R., Choudhury A.T.M., Kecske's M.L. 2004. Non-symbiotic bacterial diazotrophs in crop-farming systems: Can their potential for plant growth promotion be better exploited. *Soil Biology and Biochemistry*, 36: 1229-1244.
- Kim K.Y., Jordan D., McDonald G.A. 1998. Effect of phosphate-solubilizing bacteria and vesicular-arbuscular mycorrhizae on tomato growth and soil microbial activity. *Biology and Fertility of Soils*, 26: 79-87.

- Korte L.L., Specht J.E., Williams J.H. Sorensen R.C. 1983. Irrigation of soybean genotypes during reproductive ontogeny. Yield Component responses. Crop Science, 23: 528-533.
- Kumar V., Kumar B.V., Narula N. 2001. Establishment of phosphate\_solubilizing strains of azotobacter chroococcum in the rhizosphere and their effects on wheat cultivars under greenhouse conditions. Microbiological Research, 156 (2): 87-97.
- Lobato A.K.S., Costa R.C.L., Oliveira Neto C.F., Santos filho B.G., Cruz F.J.R., Freitas L.M.N., Cordeiro F.C. 2008. Morphological changes in soybean under progressive water stress. International Journal of Botany, 4 (2): 231-235.
- Malakooti M.J. 2005. Sustainable agriculture and increasing yield by optimizing fertilizer use in Iran. Sana Press. (In Persian).
- Malakooti M.J., Seoehr A. 2004. Optimum Nutrition of Oilseeds, an Effective Steps to Achieve Oil Self-Sufficiency in the Country. Khaniran Press, 464 p. (In Persian).
- Mei R. 1989. Yield increasing bacteria. Agricultural Press, Beijing, China, 128 p.
- Nesmith D.S., Ritchie J.T. 1992. Short- and long- term responses of corn to a preanthesis soil water deficit. Agronomy Journal, 84: 107-113.
- Neyshabouri M. R., Hatfield J.L. 1986. Soil water deficit effects on semi-determinate and indeterminate soybean growth and yield. Field Crops Research, 15: 73-84.
- Noureldin, N.A., El-Gabbal M.S., Madiha M.B. 1987. Soybean plants as affected by soil moisture stress. 1. Effect of soil moisture stress on growth of Clark and Called varieties. Annals of Agriculture Science, Ain Shams University, 32: 1161-1172.
- Ogini Y.O., Stonehouse O.P., Clard E.A. 1999. Comparison and conventional dairy farms in Ontario. A. M. J. Alternative Agriculture, 14: 122-128.
- Okon Y., Kapulnik Y. 1986. Development and function of *Azospirillum* inoculated roots. Plant Soil, 90: 3-16.
- Pannu R.K., Singh D.P., Singh P., Sangwan V.P., Chaudhary B.D. 1992. Effect of moisture stress on growth, partitioning of biomass and harvest index of oilseed brassicas. Crop Research, 5: 31-43.
- Pedersen P., Lauer J.G. 2004. Soybean: Response of Soybean Yield Components to Management System and Planting Date. American Society of Agronomy Journal, 96: 1372-1381.
- Razi S.S., Sen S.P. 1996. Amelioration of water stress effects on wetland rice by urea-N, plant growth regulators, and foliar spray of a diazotrophic bacterium *Klebsiella* sp. Biology Fertility Soils, 23: 454-458.
- Ribas-Carbo M., Taylor N.L., Giles L., Busquets S., Finnegan P.M., Day D.A., Lambers H., Medrano H., Berry J.A., Flexas J. 2005. Effects of water stress on respiration in soybean leaves. Plant Physiology 139: 466-473.

- Rodelas B., Gonzalez-Lopez J., Pozo C., salmeron V., Martinez-toledo M.V. 1999. Response of faba been (*Vicia faba* L.) to combined inoculation with *Azotobacter* and *Rhizobium leguminosarom* bv. Viceae. *Applied Soil Ecology*, 12: 51-59.
- Rostamzadeh-Kaleibar M., Farboodi M., Hosseinzadeh-Moghbali A., Razmi, N. 2011. The effect of irrigation regimes on yield and yield components of second cultivars of soybean cultivars in Moghan region. *Ecophysiology of Crops and Weeds*, 20: 15-28. (In Persian).
- Rubenchik L.I. 1963. *Azotobacter* and its use in agriculture. Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem, 278 p.
- Seddigh M., Jollif G.D. 1986. Remobilization patterns of C and N in soybeans with different sink-source ratios induced by various night temperatures. *Plant Physiology*, 81: 136-141.
- Senthong C., Tedia K., Barlaan E., Pandey R. K. 1986. Drought response of soybean genotype during reproductive growth phase under irrigation gradient [Philippines]. Los Banos, Laguna, 34 p.
- Sharief A.E., Keshta M.M. 2006. Influence of sowing date and plant density on growth and yield of canola (*Brassica napus*, L) under salt affected soils in Egypts. *Scientific Journal of King Faisal University (Basic and Applied Sciences)*, 3 (1): 65-78.
- Shaw R.H., Laing D.R. 1966. Moisture stress and plant response. In: Pierre, W.H. (Ed.), *Plant Environment and Efficient Water Use*. ASA and SSSA, Madison, W.I., Pp: 73-94.
- Soltani A. 2015. Application of SAS software in statistical analyzes (for agricultural fields). *Jahad Daneshgahi Mashhad*, 182 p. (In Persian).
- Somasegaran P., Hoben H.J. 1994. *Handbook for rhizobia: methods in legumerhizobium technology*. New York: Springer-Verlag. U.S.A., 450 p.
- Stajner D., Kevrean S., Gašaić O., Mimica-Dudić N., Zongli H. 1997. Nitrogen and *Azotobacter chroococcum* enhance oxidative stress tolerance in sugar beet. *Biology Plant*, 39: 441-445.
- Tanguilic V.C., Yambao E.B., Otoole J.C., De Datta S.K. 1987. Water stress effects on leaf elongation, leaf water potential, transpiration and nutrient uptake of rice, maize and soybean. *Plant Soil*, 103: 155-168.
- Tavassoli A.A., Ghanbari M., Ahmadi M., Heydari M. 2009. The effect of manure on forage and grain yield of millet (*Panicum miliaceum*) and beans (*Phaseolus vulgaris*) in intercropping. *Iranian Journal of Crop Sciences*, 8 (2): 1-11. (In Persian).
- Taylor A.j., Smith C.j., Wilson I.B. 1991. Effect of irrigation and nitrogen fertilizer on yield, oil content, nitrogen accumulation and water use of canola. *Fertilizer Research*, 29: 249-260.

- Varela B.D. 1998. Deficit irrigation during the reproductive stages of soybean. College, Laguna (philippines), 97 p.
- Viets F.G. 1972. Water deficits and nutrient availability. In: Water deficits and plant growth. Ed. Kozlowsk T.T. Academic Press, New York, vol. III, Pp. 217-239
- Wang P., Isoda A., Wei G. 1995. Growth and adaptation of soybean cultivars under water stress conditions. Yield response and dry matter production. Japanese Journal Crop Science, 64 (4): 777-783.
- Yasari E. 2013. Effect of phosphate solubilizing bacteria as biological fertilizers and mineral phosphorus on soybean (*Glycine max* Merrill) growth and yield of Talar cultivar in northern Iran. Journal of Applied Ecophysiology of Plants, 1 (1): 1-18. (In Persian).
- Zahire Z.A., Arshad M., Hussain A., Sarfaraz M. 1996. Improving wheat yield by inoculation with azotobacter under optimum fertilizer application. Pakistan Journal of Agriculture Science, 11: 129-131.